



INSTRUKCJA STOSOWANIA PREPARATÓW SANDEZIA DLA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ZWIERZĄT

Spis treści:

1. Zwierzęta hodowlane
 - a. [Bydło](#)
 - b. [Trzoda chlewna](#)
 - c. [Kury](#)
 - d. [Konie](#)
 - e. [Króliki](#)
 - f. [Gołębie](#)
 - g. [Indyki](#)
 - h. [Kaczki](#)
 - i. [Owce i kozy](#)
 - j. [Pasieki](#)
 - k. [Norki](#)
 2. [Zwierzęta domowe](#)
 3. [Produkcja pasz](#)
-

1. a Bydło

Rozsypywać równomiernie na powierzchnię dezynfekowaną w dawce 50g/m² raz w tygodniu ze szczególnym uwzględnieniem: kanałów gnojnych, kojców porodowych, stanowiskach dla krów i miejscach ich odpoczynku a szczególnie **pod wymionami**.

Jeżeli pierwszy raz używamy preparatu **SANDEZIA**, to przez pierwsze 3 dni należy rozsypywać 50g/m² codziennie, później raz w tygodniu. Dezynfekcję można przeprowadzać w obecności zwierząt. W garści dorosłej osoby mieści się około 50g preparatu.

Przed położeniem ściółki zastosować 100g/m² preparatu, następnie 50g/m² raz na tydzień sypiąc na **głęboką ściółkę**.

W przypadku wystąpienia zagrożenia chorobą, zaleca się częstsze stosowanie **SANDEZII** np. 2-3 razy w tygodniu w całej oborze, a szczególnie w pobliżu miejsc podawania paszy i wody.

W przypadku wystąpienia **chorób racic** zaleca się obsypywanie ran preparatem **SANDEZIA** lub przeprowadzanie zwierząt przez grubą warstwę rozsypanego produktu.

W przypadku pojawienia się **biegunek lub dyzenterii**, legowisko czyścić i obsypywać **SANDEZIĄ** raz dziennie. Po ustąpieniu objawów chorobowych preparat stosować raz w tygodniu.

W celu dezynfekcji ścian i trudno dostępnych miejsc zawiesiną wodną, rozpuścić w proporcji 1kg proszku na 1,5 litra wody. Zużycie 1kg/15m² powierzchni.

1. b Trzoda chlewna

Rozsypywać równomiernie na powierzchnię dezynfekowaną w dawce 50g/m² raz w tygodniu. Jeżeli pierwszy raz używamy preparatu **SANDEZIA**, to przez pierwsze 3 dni należy rozsypywać 50g/m² codziennie, później raz w tygodniu. Dezynfekcję można przeprowadzać w obecności zwierząt. W garści dorosłej osoby mieści się około 50g preparatu.

Przed położeniem ściółki zastosować 50-100g/m² preparatu (w zależności od jej grubości), następnie 50g/m² raz na tydzień sypiąc na ściółkę.

W przypadku wystąpienia zagrożenia chorobą, zaleca się częstsze stosowanie **SANDEZII** np. 2-3 razy w tygodniu w całym kojcu, a szczególnie w pobliżu miejsc podawania paszy i wody.

W kojcu u maciory ciężarnej rozpocząć na dzień przed oproszeniem, następnie dzień po oproszeniu i kontynuować raz w tygodniu.

Preparatu **SANDEZIA** można używać do „suchej kąpieli” prosiąt zaraz po urodzeniu. Wspomaga i przyspiesza procesy gojenia ran i obtarć.

W przypadku pojawienia się **biegunek lub dyzenterii**, kojec czyścić i obsypywać **SANDEZIĄ** raz dziennie. Po ustąpieniu objawów chorobowych preparat stosować raz w tygodniu.

W kojcu u odstawionych prosiąt, warchlaków, tuczników oraz luźnych loch i knurów, dezynfekcję przeprowadzamy na dzień przed wstawieniem i powtarzamy raz w tygodniu.

W celu dezynfekcji ścian i trudno dostępnych miejsc zawiesiną wodną, rozpuścić w proporcji 1kg proszku na 1,5 litra wody. Zużycie 1kg/15m² powierzchni.

1. c Kury

Rozsypywać równomiernie na powierzchnię dezynfekowaną w dawce 50g/m² raz w tygodniu. Jeżeli pierwszy raz używamy preparatu **SANDEZIA**, to przez pierwsze 3 dni należy rozsypywać 50g/m² codziennie, później raz w tygodniu. Dezynfekcję można przeprowadzać w obecności zwierząt. W garści dorosłej osoby mieści się około 50g preparatu.

Przed położeniem ściółki zastosować 50-100g/m² preparatu (w zależności od jej grubości), następnie 50g/m² raz na tydzień sypiąc na ściółkę.

W przypadku wystąpienia zagrożenia chorobą, zaleca się częstsze stosowanie **SANDEZII** np. 2-3 razy w tygodniu w całym kojcu, a szczególnie w pobliżu miejsc podawania paszy i wody.

W celu dezynfekcji ścian i trudno dostępnych miejsc zawiesiną wodną, rozpuścić w proporcji 1kg proszku na 1,5 litra wody. Zużycie 1kg/15m² powierzchni.

1. d Konie

Rozsypywać równomiernie na powierzchnię dezynfekowaną w dawce 50g/m² raz w tygodniu ze szczególnym uwzględnieniem **narożników i wejść do boksów**. Jeżeli pierwszy raz używamy preparatu **SANDEZIA**, to przez pierwsze 3 dni należy rozsypywać 50g/m² codziennie, później raz w tygodniu. Dezynfekcję można przeprowadzać w obecności zwierząt. W garści dorosłej osoby mieści się około 50g preparatu.

Przed położeniem ściółki zastosować 50-100g/m² preparatu (w zależności od jej grubości), następnie 50g/m² raz na tydzień sypiąc na ściółkę.

W przypadku wystąpienia zagrożenia chorobą, zaleca się częstsze stosowanie **SANDEZII** np. 2-3 razy w tygodniu w całym boksie, a szczególnie w pobliżu miejsc podawania paszy i wody.

W celu dezynfekcji ścian i trudno dostępnych miejsc zawiesiną wodną, rozpuścić w proporcji 1kg proszku na 1,5 litra wody. Zużycie 1kg/15m² powierzchni.

1. e Króliki

Rozsypywać równomiernie na powierzchnię dezynfekowaną w dawce 50g/m² raz w tygodniu. Jeżeli pierwszy raz używamy preparatu **SANDEZIA**, to przez pierwsze 3 dni należy rozsypywać 50g/m² codziennie, później raz w tygodniu. Dezynfekcję można przeprowadzać w obecności zwierząt. W garści dorosłej osoby mieści się około 50g preparatu.

Przed położeniem ściółki zastosować 50-100g/m² preparatu (w zależności od jej grubości), następnie 50g/m² raz na tydzień sypiąc na ściółkę.

W przypadku wystąpienia zagrożenia chorobą, zaleca się częstsze stosowanie **SANDEZII** np. 2-3 razy w tygodniu w całym kojcu, a szczególnie w pobliżu miejsc podawania paszy i wody.

W celu dezynfekcji ścian i trudno dostępnych miejsc zawiesiną wodną, rozpuścić w proporcji 1kg proszku na 1,5 litra wody. Zużycie 1kg/15m² powierzchni.

1. f Gołębie

Rozsypywać równomiernie na powierzchnię dezynfekowaną w dawce 50g/m² raz w tygodniu. Jeżeli pierwszy raz używamy preparatu **SANDEZIA**, to przez pierwsze 3 dni należy rozsypywać 50g/m² codziennie, później raz w tygodniu. Dezynfekcję można przeprowadzać w obecności zwierząt. W garści dorosłej osoby mieści się około 50g preparatu.

W celu ochrony lub pozbycia się **piórojadów** zaleca się obsypanie **SANDEZIĄ** ciała gołębia odchylając pióra, tak by preparat dotykał bezpośrednio skóry.

W przypadku wystąpienia zagrożenia chorobą, zaleca się częstsze stosowanie **SANDEZII** np. 2-3 razy w tygodniu w całym gołębniku, a szczególnie w okolicach **poidel i misek lęgowych**.

W celu dezynfekcji ścian i trudno dostępnych miejsc zawiesiną wodną, rozpuścić w proporcji 1kg proszku na 1,5 litra wody. Zużycie 1kg/15m² powierzchni.

1. g Indyki

Rozsypywać równomiernie na powierzchnię dezynfekowaną w dawce 50g/m² raz w tygodniu. Jeżeli pierwszy raz używamy preparatu **SANDEZIA**, to przez pierwsze 3 dni należy rozsypywać 50g/m² codziennie, później raz w tygodniu. Dezynfekcję można przeprowadzać w obecności zwierząt. W garści dorosłej osoby mieści się około 50g preparatu.

Przed położeniem ściółki zastosować 50-100g/m² preparatu (w zależności od jej grubości), następnie 50g/m² raz na tydzień sypiąc na ściółkę.

W przypadku wystąpienia zagrożenia chorobą, zaleca się częstsze stosowanie **SANDEZII** np. 2-3 razy w tygodniu w całym kojcu, a szczególnie w pobliżu miejsc podawania paszy i wody.

W celu dezynfekcji ścian i trudno dostępnych miejsc zawiesiną wodną, rozpuścić w proporcji 1kg proszku na 1,5 litra wody. Zużycie 1kg/15m² powierzchni.

1. h Kaczki

Rozsypywać równomiernie na powierzchnię dezynfekowaną w dawce 50g/m² raz w tygodniu. Jeżeli pierwszy raz używamy preparatu **SANDEZIA**, to przez pierwsze 3 dni należy rozsypywać 50g/m² codziennie, później raz w tygodniu. Dezynfekcję można przeprowadzać w obecności zwierząt. W garści dorosłej osoby mieści się około 50g preparatu.

Przed położeniem ściółki zastosować 50-100g/m² preparatu (w zależności od jej grubości), następnie 50g/m² raz na tydzień sypiąc na ściółkę.

W przypadku wystąpienia zagrożenia chorobą, zaleca się częstsze stosowanie **SANDEZII** np. 2-3 razy w tygodniu w całym kojcu, a szczególnie w pobliżu miejsc podawania paszy i wody.

W celu dezynfekcji ścian i trudno dostępnych miejsc zawiesiną wodną, rozpuścić w proporcji 1kg proszku na 1,5 litra wody. Zużycie 1kg/15m² powierzchni.

1. i Owce i kozy

Rozsypywać równomiernie na powierzchnię dezynfekowaną w dawce 50g/m² raz w tygodniu. Jeżeli pierwszy raz używamy preparat **SANDEZIA**, to przez pierwsze 3 dni należy rozsypywać 50g/m² codziennie, później raz w tygodniu. Dezynfekcję można przeprowadzać w obecności zwierząt. W garści dorosłej osoby mieści się około 50g preparatu.

Przed położeniem ściółki zastosować 100g/m² preparatu, następnie 50g/m² raz na tydzień sypiąc na **głęboką ściółkę**. Jest to bardzo ważne zwłaszcza w przypadku **kocących się owiec**.

W przypadku wystąpienia zagrożenia chorobą, zaleca się częstsze stosowanie **SANDEZII** np. 2-3 razy w tygodniu w całym kojcu, a szczególnie w pobliżu miejsc podawania paszy i wody.

W celu dezynfekcji ścian i trudno dostępnych miejsc zawiesiną wodną, rozpuścić w proporcji 1kg proszku na 1,5 litra wody. Zużycie 1kg/15m² powierzchni.

1. j Pasieki

Do dezynfekcji pustego ula należy używać preparatu **SANDEZIA** przez rozsypywanie go w dawce 50g/m², następnie należy odczekać 60 minut, zgranać pozostały proszek i **wysypać z ula**.

Tak zdezynfekowany ul jest bezpieczny dla pszczół, ponadto jest wolny od bakterii, wilgoci i nieprzyjemnych zapachów.

W celu ochrony przed **mrówkami** zaleca się obsypanie preparatem **nózek ula** i bezpośrednio **pod nim**.

W celu dezynfekcji ścian i trudno dostępnych miejsc zawiesiną wodną, rozpuścić w proporcji 1kg proszku na 1,5 litra wody. Zużycie 1kg/15m² powierzchni.

1. k Norki

Rozsypywać równomiernie na powierzchnię dezynfekowaną w dawce 50g/m² raz w tygodniu. Jeżeli pierwszy raz używamy preparatu **SANDEZIA**, to przez pierwsze 3 dni należy rozsypywać 50g/m² codziennie, później raz w tygodniu. Dezynfekcję można przeprowadzać w obecności zwierząt. W garści dorosłej osoby mieści się około 50g preparatu.

Przed położeniem ściółki zastosować 50-100g/m² preparatu (w zależności od jej grubości), następnie 50g/m² raz na tydzień syścić na ściółkę.

W przypadku wystąpienia zagrożenia chorobą, zaleca się częstsze stosowanie **SANDEZII** np. 2-3 razy w tygodniu w całym kojcu, a szczególnie w pobliżu miejsc podawania paszy i wody.

W celu dezynfekcji ścian i trudno dostępnych miejsc zawiesiną wodną, rozpuścić w proporcji 1kg proszku na 1,5 litra wody. Zużycie 1kg/15m² powierzchni.

2. Zwierzęta domowe

SANDEZIA® 4in1 DEODORIZER:

- Jest Idealna do żwirków **zapachowych i bezzapachowych**.
- Współpracuje ze żwirkami **bentonitowymi, silikonowymi** jak i z **pelletem**.
- Jest neutralna dla zwierząt jak i domowników.
- Pomaga w leczeniu problemów skórnych
- Zapewnia ochronę przed pasożytami zewnętrznymi i wewnętrznymi

Wysyp równomiernie niewielką ilość (około 20g ≈ 2 płaskie łyżki stołowe) preparatu na dno kuwety i uzupełnij żwirkiem.

Można również posypywać powierzchnię żwirku neutralizatorem **SANDEZIA® 4in1 DEODORIZER**. Aby produkt nie rozniósł się na kocich łapkach poza kuwetę, nasyp dodatkowo cienką warstwę żwirku na preparat.

Produkt należy stosować raz w tygodniu lub przy każdej wymianie żwirku.

3. Produkcja pasz

-Do dezynfekcji silosów i cystern do przewozu pasz: 0,5-1kg **SANDEZII** na samochód.

-Do dezynfekcji silosów stojących: 2kg **SANDEZII** na 10m³ pojemności silosu.

-Do urządzeń produkujących pasze: mieszamy w proporcji 1:5 **SANDEZII** do ziarna, otrąb pszennych lub śruty zbożowej. Na każdą 1 tonę mieszaniny zaleca się użyć 200kg preparatu **SANDEZIA**. Otrzymaną mieszankę przepuszczamy przez całą linię produkcyjną zaczynając od kosza przejściowego, aż do mieszalnika. Dla zwiększenia efektywności dezynfekcji zaleca się usunięcie złożeń surowca lub paszy z powierzchni dezynfekowanych. Po zakończonej dezynfekcji mieszankę można zutylizować lub dodać ziarna, by zmniejszyć procentową zawartość preparatu w gotowej paszy.

Skutek biobójczy uzyskuje się po 15 minutach. Urządzenia poddane dezynfekcji należy eksploatować po upływie 60 minut. Dezynfekcję przy użyciu proszku należy stosować przy wyłączonych wentylatorach mechanicznych, by preparat jak najdłużej przylegał do powierzchni, zwłaszcza pionowych.